



Indicații:

- Febră - inclusiv febră post vaccinare
- Erupții dentare
- Dureri corporale
- Durere în gat
- Durere de cap



Mod administrare

Vârsta	Mililitri suspensie orală (miligrame Ibuprofen) pentru o administrare (o doză)	Numărul maxim de administrări (doze) pentru o zi	Intervalul între 2 doze de Ibuprofen
Copii cu vârsta între 3-12 luni	2,5 ml suspensie (conțin 50 mg Ibuprofen)	3	6-8 ore
Copii cu vârsta între 1-3 ani	5 ml suspensie (conțin 100 mg Ibuprofen)	3	6-8 ore
Copii cu vârsta între 4-6 ani	7,5 ml suspensie (conțin 150 mg Ibuprofen)	3	6-8 ore
Copii cu vârsta între 7-9 ani	10 ml suspensie (conțin 200 mg Ibuprofen)	3	6-8 ore
Copii cu vârsta între 10-12 ani	12,5 ml suspensie (conțin 250 mg Ibuprofen)	3	6-8 ore

Compoziție:

5 ml suspensie orală conțin 100 mg Ibuprofen

Beneficii:

Acțiune îndelungată de până la 8 ore.
Calmează durerea de intensitate ușoară până la moderată.